



Вакцина для профилактики гриппа

СОВИГРИПП

Вакцина гриппозная инактивированная субъединичная

СОВИГРИПП ФОРМИРУЕТ ВЫСОКИЙ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ИММУНИТЕТ ПРОТИВ СЕЗОННОГО ГРИППА. ВАКЦИНАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ЕЖЕГОДНО В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД. ВОЗМОЖНА ВАКЦИНАЦИЯ В НАЧАЛЕ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПОДЪЕМА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГРИППОМ.

Показания к применению:

Активная ежегодная профилактическая иммунизация против сезонного гриппа детей с 6 месяцев, подростков (до 18 лет применяется вакцина без консерванта), взрослых без ограничения возраста и беременных женщин во II-III триместрах беременности (применяется вакцина без консерванта).



Противопоказания:

- Аллергические реакции на куриный белок и компоненты вакцины.
- Сильная поствакцинальная реакция (температура выше 40 градусов, отёк и гиперемия в месте введения выше 8 см в диаметре) или осложнение (коллапс, судороги, анафилаксия) на предыдущее введение препарата.
- Острые инфекционные/неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний.
- При нетяжелых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях вакцинацию проводят после нормализации температуры.



Для вакцинации против гриппа обратитесь в поликлинику по месту прикрепления.

НА ТЕРРИТОРИЮ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СОВИГРИПП ПОСТУПИЛ ДЛЯ ИММУНИЗАЦИИ **ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ**

Перед вакцинацией обязателен осмотр врачом (фельдшером) с проведением термометрии.



Способ введения:

Детям старше 3 лет, подросткам и взрослым вакцину вводят однократно внутримышечно в верхнюю треть наружной поверхности плеча (в область дельтавидной мышцы) в дозе 0,5 мл.

Детям от 6 мес. до 3 лет вакцину вводят в дозе 0,25 мл. двукратно с интервалом 4 недели в передненаружную поверхность бедра внутримышечно.